

Andamento delle coperture vaccinali in alcune coorti di nascita prima e dopo l'applicazione del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, cosiddetto *decreto legge sui nuovi obblighi vaccinali*

A cura del Gruppo Malinf della Regione Puglia* e dei SISP delle Aziende Sanitarie Locali

* Gruppo Malinf della Regione Puglia: Domenico Martinelli, Francesca Fortunato, Maria Giovanna Cappelli, Giulia Del Matto, Maria Grazia Lopuzzo, Antonio Tommasi, Francesca Zampano, Rosa Prato



Regione Puglia

	Rilevazione 31.12.2016			Rilevazione 31.12.2017			Differenza (Δ)		
	<i>Bambini ≤ 24 mesi</i>			<i>Bambini ≤ 36 mesi</i>			N. dosi	CV (%)	
	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)			
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	29851	31981	93,3	30740	32167	95,6	889	2,2	▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	29851	31981	93,3	30740	32167	95,6	889	2,2	▲
Anti-epatite B (3 dosi)	29853	31981	93,3	30688	32167	95,4	835	2,1	▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	29834	31981	93,3	30652	32167	95,3	818	2,0	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	27464	31981	85,9	29919	32167	93,0	2455	7,1	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	26344	31981	82,4	29111	32167	90,5	2767	8,1	▲

	<i>Bambini ≤ 36 mesi</i>			<i>Bambini ≤ 48 mesi</i>			N. dosi	CV (%)	
	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)			
	Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	31315	33099	94,6	31732	33299	95,3	417	0,7
Anti-poliomielite (3 dosi)	31318	33099	94,6	31734	33299	95,3	416	0,7	—
Anti-epatite B (3 dosi)	31314	33099	94,6	31693	33299	95,2	379	0,6	—
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	31301	33099	94,6	31625	33299	95,0	324	0,4	—
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	28957	33099	87,5	31071	33299	93,3	2114	5,8	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	27315	33099	82,5	30081	33299	90,3	2766	7,8	▲

	<i>Bambini di 7 anni</i>			<i>Bambini di 8 anni</i>			N. dosi	CV (%)	
	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)			
	Anti-difterite-tetano-pertosse (4 dosi*)	31115	37459	83,1	33809	37521	90,1	2694	7,0
Anti-poliomielite (4 dosi*)	31105	37459	83,0	33807	37521	90,1	2702	7,1	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	29730	37459	79,4	32644	37521	87,0	2914	7,6	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	28242	37459	75,4	31288	37521	83,4	3046	8,0	▲

*o almeno 3 dosi se ciclo primario terminato dopo il compimento del terzo anno di vita

	<i>Adolescenti di 15 anni</i>			<i>Adolescenti di 16 anni</i>			N. dosi	CV (%)	
	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)			
	Anti-difterite-tetano-pertosse (5 dosi**)	21595	41771	51,7	26830	42314	63,4	5235	11,7
Anti-poliomielite (5 dosi**)	20272	41771	48,5	25229	42314	59,6	4957	11,1	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	37570	41771	89,9	38715	42314	91,5	1145	1,6	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	10829	41771	25,9	11365	42314	26,9	536	0,9	—
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	34330	41771	82,2	35604	42314	84,1	1274	2,0	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	8563	41771	20,5	8973	42314	21,2	410	0,7	—

**o 4 dosi o almeno 3 dosi in base all'età del ciclo primario e del successivo richiamo

LEGENDA	
▲	Δ CV >1%
—	Δ CV tra -1% e +1%
▼	Δ CV <-1%



ASL Bari

	Rilevazione 31.12.2016			Rilevazione 31.12.2017			Differenza (Δ)		
Coorte 2014	Bambini ≤ 24 mesi			Bambini ≤ 36 mesi			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	CV (%)	▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	9246	10144	91,1	9775	10318	94,7	529	3,6	▲
Anti-epatite B (3 dosi)	9246	10144	91,1	9775	10318	94,7	529	3,6	▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	9246	10144	91,1	9775	10318	94,7	529	3,6	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	8465	10144	83,4	9474	10318	91,8	1009	8,4	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	8255	10144	81,4	9212	10318	89,3	957	7,9	▲
Coorte 2013	Bambini ≤ 36 mesi			Bambini ≤ 48 mesi			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	CV (%)	—
Anti-poliomielite (3 dosi)	9788	10364	94,4	9872	10432	94,6	84	0,2	—
Anti-epatite B (3 dosi)	9788	10364	94,4	9872	10432	94,6	84	0,2	—
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	9788	10364	94,4	9872	10432	94,6	84	0,2	—
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	9027	10364	87,1	9654	10432	92,5	627	5,4	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	8778	10364	84,7	9344	10432	89,6	566	4,9	▲
Coorte 2009	Bambini di 7 anni			Bambini di 8 anni			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (4 dosi*)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	CV (%)	▲
Anti-poliomielite (4 dosi*)	9404	11543	81,5	10211	11618	87,9	807	6,4	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	8897	11543	77,1	9887	11618	85,1	990	8,0	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	8415	11543	72,9	9281	11618	79,9	866	7,0	▲
*o almeno 3 dosi se ciclo primario terminato dopo il compimento del terzo anno di vita									
Coorte 2001	Adolescenti di 15 anni			Adolescenti di 16 anni			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (5 dosi**)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	Popolazione	CV (%)	N. dosi	CV (%)	▲
Anti-poliomielite (5 dosi**)	5737	12853	44,6	7323	13137	55,7	1586	11,1	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	5581	12853	43,4	7090	13137	54,0	1509	10,5	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	10924	12853	85,0	11594	13137	88,3	670	3,3	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	2671	12853	20,8	2844	13137	21,6	173	0,9	—
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	9490	12853	73,8	10047	13137	76,5	557	2,6	▲
	1826	12853	14,2	1968	13137	15,0	142	0,8	▲
**o 4 dosi o almeno 3 dosi in base all'età del ciclo primario e del successivo richiamo									

LEGENDA	
▲	Δ CV >1%
—	Δ CV tra -1% e +1%
▼	Δ CV <-1%



ASL Brindisi

	Rilevazione 31.12.2016			Rilevazione 31.12.2017			Differenza (Δ)		
Coorte 2014	Bambini ≤ 24 mesi			Bambini ≤ 36 mesi			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	2810	3025	92,9	2883	3032	95,1	73	2,2	▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	2810	3025	92,9	2883	3032	95,1	73	2,2	▲
Anti-epatite B (3 dosi)	2810	3025	92,9	2883	3032	95,1	73	2,2	▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	2810	3025	92,9	2883	3032	95,1	73	2,2	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	2561	3025	84,7	2785	3032	91,9	224	7,2	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	2487	3025	82,2	2697	3032	89,0	210	6,7	▲
Coorte 2013	Bambini ≤ 36 mesi			Bambini ≤ 48 mesi			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	3049	3227	94,5	3083	3228	95,5	34	1,0	▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	3049	3227	94,5	3083	3228	95,5	34	1,0	▲
Anti-epatite B (3 dosi)	3049	3227	94,5	3083	3228	95,5	34	1,0	▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	3049	3227	94,5	3083	3228	95,5	34	1,0	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	2859	3227	88,6	3000	3228	92,9	141	4,3	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	2785	3227	86,3	2910	3228	90,1	125	3,8	▲
Coorte 2009	Bambini di 7 anni			Bambini di 8 anni			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (4 dosi*)	3008	3688	81,6	3232	3669	88,1	224	6,5	▲
Anti-poliomielite (4 dosi*)	3008	3688	81,6	3232	3669	88,1	224	6,5	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	2881	3688	78,1	3166	3669	86,3	285	8,2	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	2737	3688	74,2	2969	3669	80,9	232	6,7	▲
*o almeno 3 dosi se ciclo primario terminato dopo il compimento del terzo anno di vita									
Coorte 2001	Adolescenti di 15 anni			Adolescenti di 16 anni			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (5 dosi**)	1997	3965	50,4	2407	3947	61,0	410	10,6	▲
Anti-poliomielite (5 dosi**)	1961	3965	49,5	2378	3947	60,2	417	10,8	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	3390	3965	85,5	3513	3947	89,0	123	3,5	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	876	3965	22,1	940	3947	23,8	64	1,7	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	3064	3965	77,3	3218	3947	81,5	154	4,3	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	642	3965	16,2	710	3947	18,0	68	1,8	▲
**o 4 dosi o almeno 3 dosi in base all'età del ciclo primario e del successivo richiamo									

LEGENDA	
▲	Δ CV >1%
■	Δ CV tra -1% e +1%
▼	Δ CV <-1%

ASL Bt

	Rilevazione 31.12.2016	Rilevazione 31.12.2017	Differenza (Δ)		
Coorte 2014	Bambini ≤ 24 mesi	Bambini ≤ 36 mesi	N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	2970	3074	104	3,3	▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	2970	3074	104	3,3	▲
Anti-epatite B (3 dosi)	2972	3071	99	3,1	▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	2965	3053	88	2,8	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	2763	3016	253	7,8	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	2709	2942	233	7,2	▲
Coorte 2013	Bambini ≤ 36 mesi	Bambini ≤ 48 mesi	N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	3099	3163	62	2,9	▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	3102	3163	61	2,9	▲
Anti-epatite B (3 dosi)	3098	3155	57	2,7	▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	3095	3131	36	2,1	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	2880	3089	209	7,3	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	2843	3039	196	6,9	▲
Coorte 2009	Bambini di 7 anni	Bambini di 8 anni	N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (4 dosi*)	3217	3452	235	6,8	▲
Anti-poliomielite (4 dosi*)	3215	3450	235	6,8	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	3112	3390	278	7,9	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	3025	3275	250	7,1	▲
*o almeno 3 dosi se ciclo primario terminato dopo il compimento del terzo anno di vita					
Coorte 2001	Adolescenti di 15 anni	Adolescenti di 16 anni	N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (5 dosi**)	2319	2736	417	9,2	▲
Anti-poliomielite (5 dosi**)	2332	2714	382	8,4	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	4210	4234	24	0,2	—
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	822	861	39	0,8	—
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	3797	3860	63	1,1	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	528	572	44	0,9	—
**o 4 dosi o almeno 3 dosi in base all'età del ciclo primario e del successivo richiamo					

LEGENDA	
▲	Δ CV >1%
—	Δ CV tra -1% e +1%
▼	Δ CV <-1%



ASL Foggia

	Rilevazione 31.12.2016			Rilevazione 31.12.2017			Differenza (Δ)	
Coorte 2014	Bambini ≤ 24 mesi			Bambini ≤ 36 mesi			N. dosi	CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	4999	5202	96,1	4992	5183	96,3	-7	0,2
Anti-poliomielite (3 dosi)	4999	5202	96,1	4992	5183	96,3	-7	0,2
Anti-epatite B (3 dosi)	4999	5202	96,1	4992	5183	96,3	-7	0,2
Anti-Haemophilus influenzae tipo B (3 dosi)	4999	5202	96,1	4992	5183	96,3	-7	0,2
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	4610	5202	88,6	4723	5183	91,1	113	2,5
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	4367	5202	83,9	4633	5183	89,4	266	5,4
Coorte 2013	Bambini ≤ 36 mesi			Bambini ≤ 48 mesi			N. dosi	CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	5079	5345	95,0	5184	5389	96,2	105	1,2
Anti-poliomielite (3 dosi)	5079	5345	95,0	5184	5389	96,2	105	1,2
Anti-epatite B (3 dosi)	5079	5345	95,0	5184	5389	96,2	105	1,2
Anti-Haemophilus influenzae tipo B (3 dosi)	5079	5345	95,0	5184	5389	96,2	105	1,2
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	4718	5345	88,3	5014	5389	93,0	296	4,8
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	3639	5345	68,1	4823	5389	89,5	1184	21,4
Coorte 2009	Bambini di 7 anni			Bambini di 8 anni			N. dosi	CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (4 dosi*)	5364	6151	87,2	5791	6153	94,1	427	6,9
Anti-poliomielite (4 dosi*)	5364	6151	87,2	5791	6153	94,1	427	6,9
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	5061	6151	82,3	5284	6153	85,9	223	3,6
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	4489	6151	73,0	5284	6153	85,9	795	12,9
*o almeno 3 dosi se ciclo primario terminato dopo il compimento del terzo anno di vita								
Coorte 2001	Adolescenti di 15 anni			Adolescenti di 16 anni			N. dosi	CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (5 dosi**)	4966	6803	73,0	5562	6911	80,5	596	7,5
Anti-poliomielite (5 dosi**)	3899	6803	57,3	4357	6911	63,0	458	5,7
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	6107	6803	89,8	6139	6911	88,8	32	-0,9
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	2391	6803	35,1	2420	6911	35,0	29	-0,1
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	5735	6803	84,3	5944	6911	86,0	209	1,7
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	2315	6803	34,0	2325	6911	33,6	10	-0,4
**o 4 dosi o almeno 3 dosi in base all'età del ciclo primario e del successivo richiamo								

LEGENDA	
	Δ CV >1%
	Δ CV tra -1% e +1%
	Δ CV <-1%



ASL Lecce

	Rilevazione 31.12.2016	Rilevazione 31.12.2017	Differenza (Δ)
Coorte 2014	Bambini ≤ 24 mesi	Bambini ≤ 36 mesi	
	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	5475 5775 94,8	5583 5824 95,9	108 1,1 ▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	5475 5775 94,8	5583 5824 95,9	108 1,1 ▲
Anti-epatite B (3 dosi)	5475 5775 94,8	5583 5824 95,9	108 1,1 ▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	5463 5775 94,6	5583 5824 95,9	120 1,3 ▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	5044 5775 87,3	5470 5824 93,9	426 6,6 ▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	4571 5775 79,2	5265 5824 90,4	694 11,3 ▲
Coorte 2013	Bambini ≤ 36 mesi	Bambini ≤ 48 mesi	
	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	5821 6125 95,0	5961 6227 95,7	140 0,7 —
Anti-poliomielite (3 dosi)	5821 6125 95,0	5961 6227 95,7	140 0,7 —
Anti-epatite B (3 dosi)	5821 6125 95,0	5961 6227 95,7	140 0,7 —
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	5811 6125 94,9	5961 6227 95,7	150 0,9 —
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	5279 6125 86,2	5836 6227 93,7	557 7,5 ▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	5143 6125 84,0	5590 6227 89,8	447 5,8 ▲
Coorte 2009	Bambini di 7 anni	Bambini di 8 anni	
	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (4 dosi*)	5760 6792 84,8	6258 6814 91,8	498 7,0 ▲
Anti-poliomielite (4 dosi*)	5752 6792 84,7	6258 6814 91,8	506 7,2 ▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	5529 6792 81,4	6090 6814 89,4	561 8,0 ▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	5412 6792 79,7	5784 6814 84,9	372 5,2 ▲
*o almeno 3 dosi se ciclo primario terminato dopo il compimento del terzo anno di vita			
Coorte 2001	Adolescenti di 15 anni	Adolescenti di 16 anni	
	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi Popolazione CV (%)	N. dosi CV (%)
Anti-difterite-tetano-pertosse (5 dosi**)	4273 7893 54,1	5529 8018 69,0	1256 14,8 ▲
Anti-poliomielite (5 dosi**)	4228 7893 53,6	5460 8018 68,1	1232 14,5 ▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	7347 7893 93,1	7609 8018 94,9	262 1,8 ▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	1982 7893 25,1	2174 8018 27,1	192 2,0 ▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	6936 7893 87,9	7172 8018 89,4	236 1,6 ▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	1497 7893 19,0	1586 8018 19,8	89 0,8 —
**o 4 dosi o almeno 3 dosi in base all'età del ciclo primario e del successivo richiamo			

LEGENDA	
▲	Δ CV >1%
—	Δ CV tra -1% e +1%
▼	Δ CV <-1%



ASL Taranto

	Rilevazione 31.12.2016			Rilevazione 31.12.2017			Differenza (Δ)		
Coorte 2014	Bambini ≤24 mesi			Bambini ≤36 mesi			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	4351	4568	95,2	4433	4546	97,5	82	2,3	▲
Anti-poliomielite (3 dosi)	4351	4568	95,2	4433	4546	97,5	82	2,3	▲
Anti-epatite B (3 dosi)	4351	4568	95,2	4384	4546	96,4	33	1,2	▲
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	4351	4568	95,2	4366	4546	96,0	15	0,8	■
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	4021	4568	88,0	4451	4546	97,9	430	9,9	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	3955	4568	86,6	4362	4546	96,0	407	9,4	▲
Coorte 2013	Bambini ≤36 mesi			Bambini ≤48 mesi			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (3 dosi)	4479	4683	95,6	4471	4705	95,0	-8	-0,6	■
Anti-poliomielite (3 dosi)	4479	4683	95,6	4471	4705	95,0	-8	-0,6	■
Anti-epatite B (3 dosi)	4479	4683	95,6	4438	4705	94,3	-41	-1,3	▼
Anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (3 dosi)	4479	4683	95,6	4394	4705	93,4	-85	-2,3	▼
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	4194	4683	89,6	4478	4705	95,2	284	5,6	▲
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	4127	4683	88,1	4375	4705	93,0	248	4,9	▲
Coorte 2009	Bambini di 7 anni			Bambini di 8 anni			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (4 dosi*)	4362	5330	81,8	4865	5351	90,9	503	9,1	▲
Anti-poliomielite (4 dosi*)	4362	5330	81,8	4865	5351	90,9	503	9,1	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	4250	5330	79,7	4827	5351	90,2	577	10,5	▲
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	4164	5330	78,1	4695	5351	87,7	531	9,6	▲
<small>*o almeno 3 dosi se ciclo primario terminato dopo il compimento del terzo anno di vita</small>									
Coorte 2001	Adolescenti di 15 anni			Adolescenti di 16 anni			N. dosi	CV (%)	
Anti-difterite-tetano-pertosse (5 dosi**)	2303	5847	39,4	3273	5874	55,7	970	16,3	▲
Anti-poliomielite (5 dosi**)	2271	5847	38,8	3230	5874	55,0	959	16,1	▲
Anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV)	5592	5847	95,6	5626	5874	95,8	34	0,1	■
Anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V)	2087	5847	35,7	2126	5874	36,2	39	0,5	■
Anti-morbillo-parotite-rosolia (2 dosi di MPR o di MPRV)	5308	5847	90,8	5363	5874	91,3	55	0,5	■
Anti-varicella (2 dosi di MPRV o di monovalente V)	1755	5847	30,0	1812	5874	30,8	57	0,8	■
<small>**o 4 dosi o almeno 3 dosi in base all'età del ciclo primario e del successivo richiamo</small>									

LEGENDA	
▲	Δ CV >1%
■	Δ CV tra -1% e +1%
▼	Δ CV <-1%